

Vaccins DTP coqueluche et ROR

Informations à l'attention des parents d'enfants en bas âge

Le vaccin DTP coqueluche

Comment se nomme le vaccin DTP coqueluche ?

Le vaccin DTP coqueluche se nomme Tetravac.

Qu'est-ce que le vaccin DTP coqueluche ?

Le vaccin DTP coqueluche protège contre la diphtérie, la polio, le tétanos et la coqueluche. Toutes ces infections sont des maladies graves pouvant entraîner une hospitalisation et, dans le pire des cas, la mort.

	Symptômes courants	Complications possibles
Tétanos	Spasmes musculaires douloureux	Convulsions (épilepsie) Trismus Décès
Diphtérie	Angine Tachycardie	Difficultés respiratoires Paralysie Défaillance cardiaque Décès
Coqueluche	Toux d'irritation semblable à des quintes de toux	Difficultés respiratoires Défaillances cardiaque et pulmonaire Décès
Polio	Fièvre Céphalées Vomissements	Paralysie Décès

À qui est destiné le vaccin DTP coqueluche ?

Votre enfant devrait avoir reçu des vaccins le protégeant contre ces maladies à deux, quatre et six mois dans le cadre du vaccin hexavalent.

Pour renforcer le système immunitaire de votre enfant et le protéger davantage contre ces maladies, le vaccin doit être renouvelé lorsque les enfants ont entre 4 et 5 ans.

Quels sont les enfants pour qui la vaccination DTP coqueluche est contre-indiquée ?

Il y a très peu d'enfants pour qui la vaccination DTP coqueluche est contre-indiquée. Vous ne devez pas faire vacciner votre enfant si un vaccin précédent ou un des composants du vaccin a entraîné chez lui une réaction allergique grave (anaphylaxie) ou s'il a fait une grave réaction allergique aux antibiotiques suivants : polymyxine B, streptomycine ou néomycine.

La vaccination DTP coqueluche doit être reportée si votre enfant :

- présente une forte fièvre.

Le vaccin DTP coqueluche a-t-il des effets secondaires ?

La plupart des enfants n'ont pas de problèmes suite à l'injection de ce vaccin.

Les effets secondaires les plus courants sont l'apparition d'une sensibilité, d'une rougeur ou d'un gonflement au niveau du bras. Dans de rares cas, le gonflement du bras peut s'étendre de l'épaule jusqu'au coude. Ce type de réaction survient généralement dans les deux jours suivant la vaccination et disparaît sous quatre à cinq jours. Le recours aux antibiotiques n'est pas nécessaire pour traiter ce type de réactions locales. Vous pouvez administrer du paracétamol ou de l'ibuprofène à l'enfant. Il doit également boire beaucoup. Veillez à ce que votre enfant n'ait pas trop chaud et à ce que ses vêtements ne frottent pas l'endroit où l'injection a été pratiquée.

Plus rarement, les enfants peuvent souffrir de fièvre ou de maux de tête, ou se sentir mal.

Le vaccin ROR

Comment se nomme le vaccin ROR ?

Le vaccin ROR est soit le Priorix, soit le M-M-RVaxPro.

Qu'est-ce que le vaccin ROR ?

Le vaccin ROR protège votre enfant contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (également connue sous le nom de « rougeole allemande »).

La rougeole, les oreillons et la rubéole sont des maladies causées par des virus et sont extrêmement contagieuses. Elles se propagent lorsque le virus est transmis par une personne contaminée à une personne non protégée contre ce virus.

	Symptômes courants	Complications possibles
Rougeole	Fièvre Éruptions cutanées Yeux rouges et douloureux	Encéphalite (inflammation du cerveau) Pneumonie Bronchite Otites
Oreillons	Gonflement douloureux des glandes salivaires sous les oreilles et fièvre	Méningite Surdité Gonflement douloureux des testicules chez les hommes adultes
Rubéole	Fièvre et éruption cutanée	Si une femme enceinte contracte la rubéole, le fœtus risque de sévères malformations telles que la cécité, des lésions cérébrales, la surdité, des problèmes cardiaques et d'autres séquelles graves

À qui est destiné le vaccin ROR ?

Votre enfant devrait avoir reçu le vaccin ROR à l'âge de 12 mois. Le vaccin doit être renouvelé lorsque les enfants ont entre 4 et 5 ans. Ces deux doses du vaccin ROR assureront à votre enfant la meilleure protection.

Si votre enfant reçoit le vaccin ROR pour la première fois, une seconde dose devra lui être administrée un mois après la première.

Quels sont les enfants pour qui la vaccination ROR est contre-indiquée ?

Il y a très peu d'enfants pour qui la vaccination ROR est contre-indiquée. Vous ne devez pas faire vacciner votre enfant s'il a fait une réaction allergique grave (anaphylaxie) à un précédent vaccin ROR, à tout composant du vaccin, à la néomycine ou à la gélatine qui sont contenus dans le vaccin ROR.

Il est recommandé de reporter la vaccination ROR si votre enfant :

- présente une forte fièvre ;
- a pris une dose importante de corticostéroïdes ;
- suit un traitement tel qu'une chimiothérapie ou une radiothérapie ;
- souffre d'une maladie ou d'une affection qui touche son système immunitaire.

Y a-t-il un lien entre le vaccin ROR et l'autisme ?

Non, les recherches ont montré qu'il n'existe aucun lien entre le vaccin ROR et l'autisme.

Le vaccin ROR a-t-il des effets secondaires ?

La plupart des enfants n'ont pas de problèmes suite à l'injection de ce vaccin. Les effets secondaires sont bien moins fréquents après une deuxième dose de vaccin ROR.

Certains enfants peuvent présenter une sensibilité, un gonflement et une rougeur sur le site de l'injection. Dans de rares cas, certains enfants peuvent développer une « mini-rougeole » accompagnée de fièvre et d'éruptions cutanées 6 à 10 jours plus tard. Les enfants peuvent présenter des mini-oreillons accompagnés d'un gonflement dans la région de la mâchoire dans la troisième semaine suivant la vaccination. Ceux-ci ne sont pas contagieux.

Vos enfants doivent être protégés de ces sept maladies infectieuses lorsqu'ils commencent à aller à l'école.

Les vaccins DTP coqueluche et ROR sont administrés le même jour. Votre enfant recevra un vaccin à chaque bras.

Votre enfant a déjà reçu des vaccins le protégeant contre la diphtérie, la polio, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, les oreillons et la rubéole lorsqu'il était bébé. L'immunité contre ces maladies diminuant avec le temps, une dose de rappel est actuellement recommandée afin d'assurer une protection supplémentaire.

Le système immunitaire de votre enfant peut facilement composer avec ces vaccins. Ces vaccins sont donnés ensemble à votre enfant, afin de lui donner la meilleure protection contre ces maladies.

Comment obtenir ces vaccins pour votre enfant ?

Ces vaccins sont proposés à l'école dans le cadre des programmes de vaccination HSE. Vous recevrez de plus amples informations ainsi qu'un formulaire de consentement avant que votre enfant ne soit vacciné.

Dans les comtés du Donegal, de Sligo et de Leitrim, ces vaccins sont administrés par votre généraliste. Dans ces comtés, une lettre vous sera adressée par le HSE vous demandant de vous présenter chez votre généraliste à la date supposée de vaccination.

Comment votre enfant peut-il se préparer au jour de la vaccination ?

Le jour de la vaccination, votre enfant doit :

- prendre son petit-déjeuner ;
- porter un haut ample et à manches courtes ;
- apporter, si possible, son carnet de vaccination à l'école.

Que se passe-t-il si votre enfant est absent le jour de la vaccination à l'école ?

Votre enfant peut encore être vacciné. Le centre de santé HSE prendra les dispositions nécessaires pour que votre enfant soit immunisé dans une clinique HSE, ou bien on peut vous demander d'amener votre enfant au cabinet de votre généraliste pour le faire vacciner.

Que se passe-t-il si votre enfant doit recevoir une seconde dose du vaccin ROR ?

Le HSE prendra les dispositions nécessaires pour que votre enfant soit vacciné.

Plus d'informations

Pour toute question ou demande d'informations, veuillez vous adresser à un membre de votre équipe de vaccination scolaire HSE, votre infirmière de santé publique ou votre généraliste.

Consultez notre site web www.immunisation.ie pour obtenir davantage d'informations concernant ces maladies infectieuses et les vaccins.

Vous pouvez également trouver les liens vers les notices des vaccins sur le site www.hpra.ie. Cherchez les termes Tetravac (DTP coqueluche), Priorix ou M-M-RVaxPro (ROR) ou scannez le code QR pour lire les brochures d'information destinées aux patients.

Formulaire de consentement aux vaccins

Vous devez lire et signer le formulaire de consentement inclus dans cette pochette et le faire parvenir à l'école de sorte que votre enfant puisse s'y faire vacciner.

Il se peut que le programme de vaccination scolaire du HSE doive être mis en œuvre dans un lieu différent ou retardé en raison du Covid-19. Le HSE fera tout son possible pour limiter les changements.