



Covid-19 Cjepivo

Važne informacije o cjepivu tvrtke
AstraZeneca, Vaxzevria

Što možete očekivati nakon vašeg
cjepiva Vaxzevria (AstraZeneca) protiv
bolesti COVID-19

9. verzija

15. lipnja 2021.



Ríaltas na hÉireann
Government of Ireland

O ovom letku

U ovom se letku govori o cjepivu protiv bolesti COVID-19 (koronavirusa). Donosi sljedeće informacije:

- što je COVID-19
- što je cjepivo protiv bolesti COVID-19
- tko bi se trebao cijepiti
- zašto je važno cijepiti se
- tko se ne bi trebao cijepiti i tko bi trebao odgoditi cijepljenje
- sigurnost cjepiva i njegove nuspojave
- gdje se može dobiti više informacija

Pažljivo pročitajte ovaj letak. O cjepivu možete razgovarati i sa zdravstvenim djelatnicima kao što su liječnik ili ljekarnik.

Što je COVID-19?

COVID-19 je bolest koja može zahvatiti pluća i dišne putove, a ponekad i druge dijelove tijela. Uzrokuje je virus nazvan koronavirus.

COVID-19 vrlo je zarazna bolest. Širi se zrakom kapljicama koje nastaju kad ljudi kašju ili kišu ili kad dodirnu površine na koje su kapljice sletjele, a zatim dodirnu oči, nos ili usta.

COVID-19 može uzrokovati ozbiljne bolesti, hospitalizaciju, pa čak i smrt.

Uobičajeni simptomi bolesti COVID-19 uključuju:

- groznicu (visoku temperaturu od 38 Celzijevih stupnjeva ili više)
- novi kašalj – može biti bilo koja vrsta kašlja, ne samo suhi
- zaduhu ili poteškoće s disanjem
- gubitak ili promjenu osjeta mirisa ili okusa – to znači da ste primijetili da ne možete ništa namirisati ili okusiti ili da stvari mirisu ili imaju drugačiji okus od uobičajenog

Ne morate imati sve navedene simptome, možete se jednostavno osjećati općenito lošije nego inače. Može proći i do 14 dana dok se simptomi ne pojave. Mogu biti slični simptomima prehlade ili gripe.

Ako imate bilo koji od simptoma bolesti COVID-19, samoizolirajte se (ostanite u svojoj sobi) i nazovite svog liječnika opće prakse (liječnika). On vam može dogоворити testiranje на болест COVID- 19.

Više informacija o bolesti COVID-19, potražite na **www.hse.ie/coronavirus** ili nazovite HSELive na **1850 24 1850**.

Tko je najugroženiji od bolesti COVID-19?

Kod osoba starijih od godina te osoba s određenim zdravstvenim stanjima veća je opasnost da se ozbiljno razbole ako obole od bolesti COVID-19.

Što je cjepivo protiv bolesti COVID-19?

Cjepivo je tvar koja bi trebala poboljšati imunitet (zaštitu) na određenu bolest. Cjepivo protiv bolesti COVID-19 pružit će vam zaštitu od iste. Ako se ljudi cijepe, to bi trebalo smanjiti i broj teško bolesnih ili čak umrlih od bolesti COVID-19 u našoj zajednici.

Cjepiva imunološki sustav uče na koji način mogu zaštititi od bolesti. Puno je sigurnije da imunološki

sustav cijepljenjem nauči kako se zaštititi, nego li obolijevanjem od bolesti COVID-19.

Tko bi se trebao cijepiti?

Popis skupina za cijepljenje možete pogledati na web-mjestu: **www.gov.ie/covid19vaccine**

Iako vi sami odlučujete o tome hoćete li se cijepiti, HSE, Svjetska zdravstvena organizacija i Ministarstvo zdravstva preporučuju da to napravite čim vam se cjepivo ponudi.

Cjepivo će vam se dati čim stigne u Irsku.

Kad dođe red na vas, obavijestit će vas o načinu cijepljenja oglašavanjem ili izravnim pozivom. Važno je da prije toga ne kontaktirate HSE u vezi s cijepljenjem.

Prije cijepljenja morate pročitati ovaj letak i letak o informacijama za pacijente proizvođača. Letak s informacijama za pacijente proizvođača možete pronaći na: **www.hse.ie/covid19vaccinePIL**

Prije toga možete razgovarati i sa zdravstvenim djelatnikom. Ako se odlučite cijepiti, dat ćeće svoju suglasnost koja će biti zabilježena.
HSE omogućuje besplatno cijepljenje.

Zašto je važno cijepiti se protiv bolesti COVID-19?

Cijepljenjem protiv bolesti COVID-19 smanjuje se opasnost od obolijevanja od bolesti COVID-19 i pruža se zaštita od težih komplikacija bolesti COVID-19. Naš je cilj ponuditi cjepivo stanovništvu kako bismo zaštitili ljudе te smanjili broj oboljelih i broj smrtnih slučajeva uzrokovanih ovim virusom.

Već sam prebolio bolest COVID-19, trebam li se cijepiti?

Da. Čak i ako ste već preboljeli bolest COVID-19, mogli biste ju ponovno dobiti.

Cjepivo će smanjiti rizik od ponovnog obolijevanja od bolesti COVID-19. Čak i ako ponovno obolite, cjepivo može smanjiti ozbiljnost vaših simptoma.

Trenutačno bolujem od bolesti COVID-19, trebam li se cijepiti?

Ne. Cijepljenje trebate odgoditi dok se ne oporavite od bolesti COVID-19.

To napravite za:

- najmanje četiri tjedna nakon prvog primjećivanja simptoma ili
- četiri tjedna nakon pozitivnog testa na bolest COVID-19

Primanje cjepiva

Tko će me cijepiti?

Cijepitelj je osoba koja cijepi. HSE ih je obučio za davanje cjepiva protiv bolesti COVID-19.

Može li se od cjepiva protiv bolesti COVID-19 dobiti COVID-19?

Ne. Od cjepiva protiv bolesti COVID-19 ne može se dobiti COVID-19. Može se dogoditi da se osoba zarazila bolešću COVID-19 prije cijepljenja i da nije primijetila simptome sve do trenutka nakon cijepljenja.

Ako imate bilo koji od simptoma bolesti COVID-19, obavezno se samoizolirajte (ostanite doma) i dogovorite besplatno testiranje kako biste saznali jeste li oboljeli od bolesti COVID-19.

Ako nakon dva ili više dana od cijepljenja dobijete groznicu, samoizolirajte se i zatražite od svog liječnika opće prakse da vam dogovori testiranje na bolest COVID-19.

Ako nakon prve doze cijepiva imate simptome bolesti COVID-19, i dalje morate primiti drugu dozu. Iako već nakon prve doze imate određenu zaštitu, druga vam doza daje najbolju zaštitu od virusa.

Trebam li se cijepiti protiv bolesti COVID-19 ako ima visoku temperaturu?

Ne. Ako imate groznicu (temperatura od 38 Celzijevih stupnjeva ili više), cijepljenje trebate odgoditi dok ne budete bolje.

Trebam li se cijepiti ako sam trudnica ili dojilja?

Ako se primili prvu dozu, a dojilja ste, trebate dobiti i drugu dozu.

Ako se primili prvu dozu, a trudnica ste, idealno bi bilo da drugu dozu dobijete do navršenih 36 tjedana trudnoće. Veća je opasnost da ćete se razboljeti od teške bolesti ako ne primite drugu dozu.

Više informacija potražite na www.hse.ie/covidvacpreg

Koje je cjepivo dostupno?

Mi nudimo cjepivo pod nazivom Vaxzevria. Proizvođač cjepiva je tvrtka AstraZeneca.

Ovo virusno vektorsko cjepivo sadrži bezopasnu verziju drugog virusa (vektora). Ono vaše tijelo uči kako stvoriti protein koji će dovesti do imunološkog odgovora.

Vaše tijelo tada stvara antitijela koja pomažu u borbi protiv infekcije ako u budućnosti virus bolesti COVID-19 uđe u vaše tijelo.

Je li cjepivo sigurno?

HSE upotrebljava isključivo cjepiva koja ispunjavaju tražene norme sigurnosti i učinkovitosti.

Iako se rad na razvoju cjepiva protiv bolesti COVID-19 odvijao mnogo brže nego inače, cjepivo koje vam nudimo prošlo je sve uobičajene korake potrebne za razvoj i odobravanje sigurnog i djelotvornog cjepiva.

Da bi se odobrila upotreba cjepiva, cjepivo protiv bolesti COVID-19 prošlo je sva klinička ispitivanja i sigurnosne provjere koje prolaze svi drugi licencirani lijekovi,

slijedeći međunarodne sigurnosne norme.

Mi nudimo cjepivo pod nazivom Vaxzevria koje proizvodi tvrtka AstraZeneca. Ono je:

- ✓ testirano na tisućama ljudi u sklopu kliničkih ispitivanja
- ✓ ispunilo stroge standarde sigurnosti, kvalitete i djelotvornosti i regulatori su ga odobrili i licencirali. Regulator za Irsku je Europska agencija za lijekove (EMA) – više informacija potražite na www.ema.europa.eu .

Kako se daje cjepivo protiv bolesti COVID-19?

Cjepivo protiv bolesti COVID-19 daje se kao injekcija u nadlakticu. Postupak traje svega nekoliko minuta.

Koliko je potrebno doza cjepiva protiv bolesti COVID-19?

Daju se dvije doze cjepiva protiv bolesti COVID-19 da bi se dobila dugotrajna zaštita. Druga se doza daje u roku od 8 do 12 tjedana nakon prve doze.

Koje su nuspojave cjepiva?

Cjepiva, baš kao i svi lijekovi, može izazvati nuspojave.

Većina ih je blaga do umjerena, kratkoročna i ne dobivaju ih svi.

Više od jedne osobe na 10 ljudi može doživjeti:

- osjećaj umora
- pojačanu osjetljivost, modrica, bol ili svrbež u ruci na mjestu dobivanja cjepiva
- glavobolju
- bol u mišićima
- bol u zglobovima
- mučninu
- groznicu (visoku temperaturu od 38 Celzijevih stupnjeva ili više)

Kod više od jedne osobe na 100 ljudi može se pojaviti crvenilo ili oticanje na mjestu uboda, proljev, povraćanje ili nizak broj trombocita (ne izaziva nikakve simptome).

Kod više od 1 osobe na 1.000 ljudi može doći do smanjenja apetita, pojave vrtoglavice, pospanosti, znojenja, oticanja limfnih čvorova ili osipa.

Ozbiljne nuspojave, kao što su jake alergijske reakcije, vrlo su rijetke i pojavljuju se približno kod 1 osobe na 100.000 ljudi. Cijepitelj je obučen za liječenje vrlo rijetkih ozbiljnih alergijskih reakcija.

Vrlo rijetko, kod 1 osobe na 100.000 ljudi mogu se razviti vrlo neuobičajeni krvni ugrušci s niskim brojem trombocita. 1 osoba na 5 takvih ljudi može umrijeti. Manja je vjerojatnost pojave takvih krvnih ugrušaka nakon druge doze cjepiva. Opasnost od ovog vrlo rijetkog stanja viša je kod mlađih osoba.

Vrlo mali broj sindroma kapilarnog curenja pojavio se kod ljudi nakon ovog cjepiva. To je teško, ali vrlo rijetko stanje koje ponekad može biti smrtonosno.

Sa svojim liječnikom opće prakse, liječnikom ili cjepiteljem možete potražiti savjet o rizicima i prednostima primanja ovog cjepiva.

Cjepivo protiv bolesti COVID-19 prošlo je kroz ista klinička ispitivanja i sigurnosne provjere kao i sva druga licencirana cjepiva, međutim cjepivo je novo i podaci o dugoročnim nuspojavama su ograničeni.

Kako se sve više ljudi u Irskoj i diljem svijeta cijepi, bit će dostupno više informacija o nuspojavama. HSE redovito će ažurirati ove podatke na našem web-mjestu, a prema potrebi, ažurirat će i informativne letke koji se daju ljudima kod primanja prve doze cjepiva.

Simptomi vrlo rijetkih krvnih ugrušaka

Čak i ako je opasnost od pojave krvnih ugrušaka sa smanjenim brojem trombocita iznimno niska, morate znati na koje znakove trebate paziti.

Potražite hitnu liječničku pomoć ako dobijete bilo koji od ovih simptoma nakon cijepljenja cjepivom Vaxzevrija:

- ostajete bez daha
- bol u prsnom košu ili trbuhu
- oticanje ili hladnoća u nogama
- jaka ili sve teža glavobolja, konfuzija ili napadaji
- uporno krvarenje ispod kože gdje ranije nije bilo ozljede
- brojne male modrice, crvenkaste ili ljubičaste točke ili potkožni hematomi

Vrlo rijetki krvni ugrušci s malim brojem trombocita obično su prijavljivani u roku od 14 dana nakon

cijepljenja cjepivom Vaxzevrija. Pratite pojavljuju li se ti simptomi u tjednima nakon cijepljenja.

Simptomi vrlo rijetkog kapilarnog curenja

Sindrom kapilarnog curenja uzrokuje curenje tekućina iz malih krvnih žila. Čak i ako je opasnost od pojave ovog stanja iznimno niska, morate znati na koje znakove trebate paziti.

Potražite hitnu liječničku pomoć ako dobijete bilo koji od ovih simptoma nakon cijepljenja cjepivom Vaxzevrija:

- brzo naticanje udova (ruku i nogu)
- naglo povećanje težine

Možete osjećati i nesvjesticu zbog niskog krvnog tlaka.

Sindrom kapilarnog curenja obično se prijavljuje u roku od 4 dana nakon cijepljenja cjepivom Vaxzevrija. Pratite pojavljuju li se ti simptomi u danima nakon cijepljenja.

Groznica nakon cijepljenja

Sasvim je uobičajeno da se nakon cijepljenja razvije groznica. Obično se to dogodi u roku od dva dana (48 sati) od primanja cjepiva i nestaje u roku od dva dana.

Veća je vjerojatnost pojave groznice nakon prve doze cjepiva.

Ako se ne osjećate dobro, uzmite paracetamol ili ibuprofen prema uputama na kutiji ili letku. Ako ste zabrinuti, potražite savjet liječnika.

Postoje li ljudi koji se ne bi trebali cijepiti protiv bolesti COVID-19?

Da. Ne biste se trebali cijepiti protiv bolesti COVID-19 ako:

- ✖ imate manje od 50 godina To je zbog pojave vrlo rijetke opasnosti od pojave krvnih ugrušaka s niskim brojem trombocita nakon cijepljenja.
Ponudit će vam se drugo cjepivo.
- ✖ ste imali ozbiljnu alergijsku reakciju na bilo koji sastojak cjepiva (uključujući polisorbat 80) Popis sastojaka potražite na letku s informacijama za pacijente proizvođača.
- ✖ ako ste imali jaku alergijsku reakciju na prethodnu dozu cjepiva
- ✖ ako ste imali krvne ugruške s niskim brojem trombocita nakon prethodne doze ovog cjepiva
- ✖ ako ste imali sindrom kapilarnog curenja.

Ako ste imali neposrednu alergijsku reakciju na neko drugo cjepivo ili injekcijsku terapiju, trebali biste razgovarati sa svojim liječnikom prije nego cijepljena cjepivom protiv bolesti COVID-19.

Većina ljudi može se sigurno cijepiti. Osoba koja vas cijepi rado će odgovoriti na sva vaša pitanja na zakazanom terminu za cijepljenje.

Dobivate i letak sa savjetima za naknadnu njegu te karticu evidencije o cjepivu s imenom i brojem serije cjepiva koje ste dobili.

Trebam li primiti drugu dozu cjepiva ako imam manje od 50 godina?

Ako imate manje od 50 godina i dobili ste prvu dozu cjepiva, dugu dozu trebate dobiti u roku od 8 do 12 tjedana.

Koliko je vremena cjepivu potrebno da bi počelo djelovati?

Cjepivo djeluje 3 tjedna nakon dobivanja prve doze. Najbolju zaštitu od bolesti COVID-19 imat ćete nakon

druge doze koju trebate primiti 8 do 12 tjedana nakon prve doze.

I dalje postoji opasnost da ipak obolite od bolesti COVID-19, čak i ako ste cijepljeni.

Djeluje li cjepivo kod svih?

Cjepiva širom svijeta spašavaju najmanje 2 do 3 milijuna života godišnje, a još se više ljudi štiti od cjeloživotnih bolesti.

Milijuni osoba diljem svijeta do sada su primili cjepivo protiv bolesti COVID-19.

Postoje čvrsti i pouzdani dokazi da cjepiva protiv bolesti COVID-19 u velikoj mjeri smanjuju opasnost od obolijevanja od bolesti COVID-19. Ona su vrlo učinkovita u sprječavanju smrtnosti i teških oboljenja od bolesti COVID-19.

Ako imate oslabljeni imunološki sustav, ne postoji dodatna opasnost od cijepljenja, no cjepivo možda neće u potpunosti djelovati na vas.

Kad primim cjepivo, znači li to da neću drugima prenositi bolest COVID-19?

Još ne znamo zaustavljamo li cijepljenjem prenošenje virusa bolesti COVID-19 na druge. Zato je važno da svi i dalje pratimo javno-zdravstvene savjete o načinu zaustavljanja širenja virusa.

Posebice i dalje morate:

- održavajte smjernice fizičke udaljenosti (održavajte razmak od dva metra od ostalih, gdje god je to moguće)
- nosite masku
- redovito perite ruke

Hvala vam što štitite sebe i druge.

Koliko traje imunitet od cjepiva?

Još ne znamo koliko će imunitet trajati. U tijeku su klinička ispitivanja kako bi to utvrdilo.

Više informacija

Više informacija pročitajte na sletku s informacijama za pacijente proizvođača. Ispisat će vam se na dan

cijepljenja ili ga možete pronaći na
www.hse.ie/covid19vaccinePIL

Možete razgovarati i sa zdravstvenim djelatnicima kao što su liječnik ili ljekarnik ili tim za zdravstvenu njegu.

Možete i posjetiti web-mjesto HSE na
www.hse.ie/covid19vaccine ili nazvati HSELive na **1850 24 1850.**

Više informacija o cjepivu protiv bolesti COVID-19, uključujući materijale u drugim formatima i podršku za prijevod potražite na
www.hse.ie/covid19vaccinematerials

Kako se prijavljuju nuspojave?

Kao i kod svih cjepiva sumnju na nuspojave mogu se prijaviti Regulatornom tijelu za zdravstvene proizvode (HPRA).

HPRA je regulatorno tijelo za lijekove, medicinske uređaje i druge zdravstvene proizvode u Republici Irskoj. U sklopu svoje uloge u praćenju sigurnosti lijekova, HPRA upravlja sustavom putem kojeg

zdravstveni djelatnici ili građani mogu prijaviti sve sumnjive štetne događaje (nuspojave) povezane s lijekovima i cjepivima u Irskoj.

HPRA snažno potiče prijavljivanje sumnjivih štetnih događaja (nuspojava) povezanih s cjepivima protiv bolesti COVID-19 kako bi podržala kontinuirano praćenje njihove sigurne i učinkovite upotrebe. Sumnja na štetne događaje u vezi s cjepivom protiv bolesti COVID-19 prijavljuje se na www.hpra.ie/report

Prijavu umjesto vas može podnijeti i vaš liječnik ili član obitelji. Potrebno je navesti što više podataka te uključiti broj serije cjepiva gdje je to moguće.

HPRA ne može pružiti klinički savjet za pojedinačni slučaj. Građani bi se morali obratiti svom zdravstvenom djelatniku (liječniku ili ljekarniku) za sve eventualne probleme.

Vaši osobni podaci

HSE će obrađivati vaše osobne podatke radi sigurne primjene cjepiva i bilježenje svih informacija potrebnih za nadzor i upravljanje cjepivom. Sve informacije koje

HSE obrađuje u skladu su s općim zakonima, a posebno Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) koja je stupila na snagu 2018. godine.

Obrada vaših podataka bit će zakonita i poštena.

Obrađivat će se samo za određenu svrhu upravljanja cijepljnjem. Primjenjuje se princip minimiziranja podataka. To znači da se bilježe samo podaci koji su neophodni za vašu identifikaciju, rezerviranje termina, bilježenje cijepljenja i praćenje njegovih učinaka.

Vi, kao ispitanik prema GDPR-u, imate određena prava koja se odnose na obradu osobnih podataka.

- Možete zatražiti informacije o svojim osobnim podacima i pristup njima (obično poznatiji kao „zahtjev za pristup subjekta podataka“).
- To vam omogućuje da dobijete kopiju osobnih podataka koje imamo o vama i provjeru zakonitosti obrade istih.
- Možete zatražiti ispravak osobnih podataka koje imamo o vama. To vam omogućuje ispravljanje nepotpunih ili netočnih podataka koje imamo o vama.
- Možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka. To vam omogućuje da zatražite da izbrišemo ili uklonimo osobne podatke tamo gdje nema opravdanog razloga da ih nastavimo obradivati. Imate pravo i zatražiti da izbrišemo ili uklonimo vaše osobne podatke tamo gdje ste iskoristili svoje pravo na prigovor na njihovu obradu.
- Prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka.

Više informacija potražite na www.hse.ie/eng/gdpr

Nakon cijepljenja Cjepivom COVID-19

Vaxzevria (AstraZeneca)

Hvala vam što cijepljenjem štitite sebe i druge. Sad kad ste se cijepili, pažljivo pročitajte ovaj dokument da biste znali kako se možete osjećati u sljedećih nekoliko dana i gdje možete dobiti više informacija.

Pročitajte letak s informacijama o cjepivu protiv bolesti COVID-19 koji dobivate s cjepivom. Dajemo vam i potvrdu o današnjem cijepljenju.

Čuvajte ju na sigurnom.

Što bi se moglo dogoditi u sljedećih nekoliko dana?

Neke osobe koje su primile cjepivo koje ste vi dobili danas osjećaju sljedeće:

- pojačanu osjetljivost, oticanje, modrice, bol, crvenilo i/ili svrbež i/ili bol u ruci na mjestu dobivanja cjepiva
- umor
- glavobolju
- bol u mišićima
- bol u zglobovima
- mučninu, proljev ili povraćanje
- groznicu (visoku temperaturu od 38 Celzijevih stupnjeva ili više).

Javili su se vrlo rijetki slučajevi od neuobičajenih krvnih ugrušaka s malim brojem trombocita u prvim tjednima nakon cijepljenja. Trombociti pomažu u zgrušavanju krvi.

Odmah potražite liječničku pomoć i recite da ste se nedavno cijepili ako:

- ste bez daha
- osjećate bol u prsnom košu ili trbuhu
- dolazi do oticanja ili osjeta hladnoće u nogama
- imate jaku ili sve težu glavobolju (posebice 3 ili više dana nakon cijepljenja)
- imate zamagljeni vid, konfuziju ili napadaje
- imate uporno krvarenje ispod kože gdje ranije nije bilo ozljede
- imate brojne male modrice, crvenkaste ili ljubičaste točke ili potkožne hematome

Vrlo mali broj sindroma kapilarnog curenja pojavio se kod ljudi prvih nekoliko dana nakon ovog cijepljenja.

Odmah potražite liječničku pomoć i recite da ste se nedavno cijepili ako:

- je došlo do brzog naticanja udova (ruku i nogu)
- je došlo do naglog povećanja težine

Možete osjećati i nesvjesticu zbog niskog krvnog tlaka.

Kao i kod svih cjepiva sumnju na nuspojave mogu se prijaviti Regulatornom tijelu za zdravstvene proizvode (HPRA). Nuspojave na cjepivo protiv bolesti COVID-19 prijavite na www.hpra.ie/report

Što ako imam vrućicu ili bolove?

Ako imate vrućicu, prehladu ili bolove, možete uzeti paracetamol ili ibuprofen. Međutim, ako vaša vrućica traje više od 48 sati ili ako ste i dalje zabrinuti, potražite savjet liječnika. Trudnice ne smiju uzimati ibuprofen.

Trebam li nešto napraviti prije dobivanja druge doze cjepiva?

Prilikom dobivanja sljedeće i završne doze cjepiva, timu za cijepljenje recite ako je došlo do promjena u vašem zdravstvenom stanju.

Ponesite svoj karton evidencije o cjepivu kada idete primiti drugu dozu.

Dobre vijesti

Cijepljenje protiv bolesti COVID-19 trebalo bi vas zaštитiti od ozbiljnih komplikacija koje bolest uzrokuje.

Cjepiva imunološki sustav uče kako se zaštiti od bolesti. Puno je sigurnije da imunološki sustav cijepljenjem nauči kako se zaštiti, nego li obolijevanjem od bolesti COVID-19.

I dalje učimo

Cjepivo djeluje 3 tjedna nakon dobivanja prve doze. Najbolju zaštitu od bolesti COVID-19 imat ćeće nakon druge doze koju trebate primiti 8 do 12 tjedana nakon prve doze.

I dalje postoji opasnost da možda obolite od bolesti COVID-19, čak i ako ste cijepljeni.

Još ne znamo zaustavlja li se cijepljenjem prenošenje virusa na druge, stoga morate nastaviti slijediti javno-zdravstvene savjete:

- pridržavati se smjernica od udaljenosti
- (održavajte razmak od dva metra od ostalih, gdje god je to moguće)
- nosite masku
- redovito perite ruke.

Imate li pitanja?

Ako vam nešto nije jasno ili imate bilo kakvih pitanja o cjepivu protiv bolesti COVID-19, pitajte svog cijepitelja danas.

Potražite na www.hse.ie/covid19vaccine više informacija o cjepivu protiv bolesti COVID-19.

Nuspojave

Sve nuspojave prijavite u HPRA na
www.hpra.ie/report.

Objavio HSE, 15. lipnja 2021.



Rialtas na hÉireann
Government of Ireland